



Tumortje op het ooglid verwijderen



Oog en Welzijn
vertrouwde zorg dichtbij

Wat is een tumor?

Een tumor (zwellings) is een goed- of kwaadaardig gezwel en bestaat uit een opstapeling van cellen. Een tumor kan variëren van grootte en kan zich op verschillende plekken in het lichaam en op de huid bevinden. In deze folder richten wij ons op het verwijderen van een tumortje op het ooglid.

Oorzaak

Een ooglidtumortje begint vaak in de huid of in een kliertje bij het oog (bijvoorbeeld een zweet-/talglklier of een haarzakje). Een tumortje kan ook ontstaan uit pigmentcellen, zenuwweefsel of bloedvaten. Soms wordt een tumortje veroorzaakt door een infectie van de huid met een virus (zoals bij een wratje).

Verschijselen

Er kan een bultje op het boven-, onderooglid en/of de ooglidrand te zien zijn. Dit kan pijnlijk zijn maar dat hoeft niet. In sommige gevallen kan dit gepaard gaan met:

- schilfers en rode plekkjes
- bloed
- verlies van wimpers
- opvallende bloedvaatjes en/of pigment

Dit kan zowel in het geval van een goed- als kwaadaardig tumortje.

Soms kan een tumortje het zicht verstoren. Ook kan iemand cosmetisch hinder ondervinden. In sommige gevallen kan er een verdenking zijn van een kwaadaardig component. De oogarts kan ervoor kiezen om een tumortje te verwijderen.

Bij verdenking van een kwaadaardig tumortje, wordt het weefsel na de ingreep opgestuurd en onderzocht door een patholoog anatoom op de aanwezigheid van kwaadaardige cellen.

Behandeling

Deze relatief kleine ingreep gebeurt onder lokale verdoving op de operatiekamer in de kliniek. Voorafgaand mag u gewoon eten, drinken en eventuele medicatie innemen. De ingreep vindt poliklinisch plaats, na afloop mag u dus weer naar huis. Het wordt afgeraden om na de ingreep zelf auto te rijden. Neem dus een chauffeur mee.

Voorafgaand aan de ingreep krijgt de patiënt een muts op en hoesjes over de schoenen. Vervolgens wordt er een druppel verdoving toegediend. De patiënt wordt meegenomen naar de operatiekamer en mag plaatsnemen in de stoel. Indien nodig wordt in zittende houding de plek waar het sneetje komt afgetekend. Daarna wordt de stoel in liggende positie gebracht. Het te behandelen weefsel wordt gedesinfecteerd en de verdoving wordt ingespoten. Het hoofd wordt afgedekt met een gatdoek. Vervolgens wordt het tumortje door middel van een mesje of schaartje verwijderd. De wond wordt in sommige gevallen dichtgebrand (door middel van een cauter) of gehecht. Het kan ook zijn dat de wond vanzelf geneest zonder dat deze wordt dichtgemaakt. Afhankelijk van de grootte van het tumortje en de plek kan er een litteken zichtbaar blijven.



Oog en Welzijn
vertrouwde zorg dichtbij

Birdaarderstraatweg 72-J 9101 DC Dokkum
T +31 0519 76 00 88 E vraag@oogenwelzijn.nl | www.oogenwelzijn.nl